

دوسيتالين® ريتارد 200 ملجم

كسولات معحلة الإطلاق، صلبة
200 ملجم ميغرين هيدروكلوريد

اقرأ هذه النشرة بعناية قبل بدء تناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كنت لديك أي أسئلة إضافية، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء لك، لا تأخذه لأحد آخر، فقد يضرهم، حتى وإن كنت أعراضهم هي نفس الأعراض التي تظهر عليك.
- إذا تفاعلت حساسية أو أي من الآثار الجانبية، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي.

تحتوي هذه النشرة على:

1. ما هو دوسيتالين ريتارد وقيم يُستخدم؟
2. متى ينبغي عليك عدم تناول هذا الدواء أو توخي الحذر عند استخدامه؟
3. كيفية تناول دوسيتالين ريتارد؟
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين دوسيتالين ريتارد؟
6. معلومات أخرى

1. ما هو دوسيتالين ريتارد وقيم يُستخدم؟

يُنقل على هذا الدواء اسم دوسيتالين ريتارد 200 ملجم، وهو يحتوي على ميغرين هيدروكلوريد وينتمي إلى مجموعة من الأدوية تُدعى مضاد التشنج والتي لها تأثير على الأمعاء.

الأمعاء هي عبارة عن أنبوب عضلي طويل يمر الطعام عبره ليتم هضمه، وإذا بدأت الأمعاء في التشنج والاضطراب، فإنك تُصاب بالآلام، والطريقة التي يعمل بها هذا الدواء هي عن طريق تخفيف التشنج والآلام.

يُستخدم دوسيتالين ريتارد في الحالات التالية:

- البالغون والأطفال فوق سن 10 سنوات.
- المعالجة العرضية للآلام وتشنجات البطن، واضطرابات وانزعاج الأمعاء المتعلق بمتلازمة القولون المتهيج.
- علاج تشنج المعدة والأمعاء الناتج عن الأمراض العضوية.

2. متى ينبغي عليك عدم تناول هذا الدواء أو توخي الحذر عند استخدامه؟

لا تتناول هذا الدواء إذا كنت:

ت تعاني من الحساسية تجاه أي من مكونات الكسولة (انظر القسم "معلومات أخرى" للحصول على قائمة بالمكونات).

إذا تطبقت عليك أي من الحالات المذكورة أعلاه، فلا تتناول هذا الدواء وتحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

تناول الأدوية الأخرى

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي دواء أخرى إلى جانب دوسيتالين ريتارد.

لا توجد أي تفاعلات دوائية معروفة مع الأدوية الأخرى.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملاً أو قد تصبحين حاملاً أو كنت ترضعين رضاعة طبيعية، فاستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

- ينبغي عليك التحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت حاملاً أو قد تصبحين حاملاً، لا يُنصح باستخدام دوسيتالين ريتارد أثناء الحمل. قد ينصحك طبيبك بالتوقف عن تناول دوسيتالين ريتارد أو بتناول دواء آخر.
- ينبغي عليك التحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو قد تبدأين في إرضاع طفلك رضاعة طبيعية، لا يُنصح باستخدام دوسيتالين ريتارد أثناء الرضاعة الطبيعية. قد يطلب منك طبيبك التوقف عن الرضاعة الطبيعية أثناء تناول دوسيتالين ريتارد أو ينصحك بتناول دواء آخر إذا كنت ترغبين في الاستمرار في الرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات

ليس من المرجح أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو الآلات.

3. كيفية تناول دوسيتالين ريتارد؟

احرص دوماً على تناول دوسيتالين ريتارد تماماً كما هو موصوف في هذه النشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استمر طبيبك أو الصيدلي إن لم تكن متأكدًا.

- يمكن للبالغين والأطفال الأكبر من عمر 10 سنوات تناول دوسيتالين ريتارد.
- ابتلع الكسولة بأكملها مع كوب كامل من الماء. لا تمضغ الكسولة.
- حاول أن تتناول الكسولات كل يوم في الوقت نفسه تقريباً. يُساعدك هذا الأمر على تذكر تناول الدواء.

ما هي كمية دوسيتالين ريتارد التي يجب تناولها

- الجرعة العادية هي كسولة واحدة مرتين في اليوم.
- تناول كسولة واحدة في الصباح وكسولة واحدة في المساء.

لا تأخذ دوسيتالين ريتارد للأطفال الأصغر من 10 سنوات.

في حالة تناولك جرعة أكبر مما ينبغي من دوسيتالين ريتارد

إذا تناولت كمية من دوسيتالين ريتارد أكبر مما يُصِف لك، فتحدث إلى طبيبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور. قد يأخذ عيادة الدواء والنشرة الداخلية معك.

إذا نسيت تناول دوسيتالين ريتارد

- إذا نسيت تناول إحدى الجرعات، فخطِّط الجرعة المفقودة، أوّل الجرعة التالية في الموعد المعتاد.
- لا تتناول جرعة مزدوجة لتعويض الجرعة المفقودة.

إذا كنت لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا المنتج، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

قد يعني معظم الأشخاص من مشكلات، ولكن قد يُصاب البعض ببعض الآثار الجانبية (آثار أو تفاعلات غير مرغوبة).

قد تكون الآثار الجانبية لدوسيتالين ريتارد هي كالتالي:

إذا أصبت بأي من هذه الآثار الجانبية الخطيرة، فتوقف عن تناول دوسيتالين ريتارد. اذهب لروية طبيب على الفور (قد تحتاج إلى علاج طبي فوري):

- صعوبة التنفس، تورم الوجه أو الرقبة أو الشفاه أو اللسان أو الحلق. قد تُصاب بقرح (حساسية) تجاه هذا الدواء.

هذه الآثار الأخرى تكون أقل خطورة. إذا أزعجتك تحدث إلى أحد الصيدلي:

- قد تُصاب بقرح تحسس خفيف تجاه هذا الدواء؛ على سبيل المثال، الطفح الجلدي، احمرار وحكة في الجلد.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أصبت بأي آثار جانبية، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي. يشمل هذا أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. إبلاغك عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية تخزين دوسيتالين ريتارد؟

- يحفظ بعيداً عن متناول ومراي الأطفال.
- لا تخزن الكسولات في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
- احتفظها في عبوتها الأصلية.
- لا تستخدم الكسولات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة الكرتونية وشوائب البليستر بعد الرمز "EXP"؛ يتم تذكر شهر وسنة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في ذلك الشهر.

فترة الصلاحية

يمكن تخزين هذا المنتج لمدة 3 سنوات.

ينبغي عدم التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف أو في القمامة المنزلية. اسأل الصيدلي الذي تتعامل معه عن طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستضمن هذه التدابير التخلص بطريقة مناسبة وستساعد على حماية البيئة.

6. معلومات أخرى

محتويات دوسيتالين ريتارد

المادة الفعالة في هذا الدواء هي ميغرين هيدروكلوريد. تحتوي كل كسولة على 200 ملجم.

تحتوي الكسولة أيضاً على:

- حبيبات الكسولة: ستيرات المغنسيوم والتشتر بنسبة 30% لولني أكربلات وتلك وهيزر وماوز و إيثازر بنسبة 30% فلوئيمر حمض مينكرليك. أكريلات الإثيل المشترك (1:1) وثلاثي استرات الجليسرول.
- غلاف الكسولة: جلانتين وثنائي أكسيد التيتانيوم (E171). يحتوي جيز الطباخة على صمغ الألك (E904) وأكسيد الحديد الأسود (E172) وبيروبيلين جليكرول ومحلول أمونيا مركز وهيدروكسيد بوتاسيوم.

شكل دوسيتالين ريتارد ومحتويات العبوة

كسولات دوسيتالين ريتارد 200 ملجم الصلبة ذات الإطلاق المحكم تكون كسولات بيضاء معنمة (حجم رقم 1)، وتُحمل العلامة 245. تحتوي كل عبوة على 3 شوائب بليستر مصنوعة من الألومنيوم / الأومنيوم

تحتوي كل منها على 10 كسولات.

الشركة المصنعة:

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville

Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

فرنسا

عن:

Abbott Healthcare Products B.V. هولندا

تمت مراجعة الأخيرة لهذا النشرة في يونيو 2015

هذا الدواء

عبارة عن منتج يؤثر على صحتك ويُحرمك استخدامه على نحو مخالف للتعليمات للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب، إلى جانب طريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي يباع لك الدواء.

- الطبيب والصيدلي هما أهل الخبرة في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك، من إتمامها بدون الحاجة، أو لأجل طبيبك، إلا مع.

- لا تكرر - مسرف - المسفة الطبية دون الإحاطة بالآثار الجانبية المحتملة.